

Informácie pre užívateľov

Avemar - granulát

Avemar - filmom obalené tablety

Pre pacientov s nádorovými ochoreniami

avemar

granulát

dietetická potravina
na osobitné medicínske účely
pre pacientov s nádorovými ochoreniami



Informácie pre užívateľov

1. Čo je Avemar?

Avemar je špeciálna výživa – dietetická potravina pre pacientov s nádorovými ochoreniami.

2. Aké sú aktívne zložky Avemaru?

1 vrecko Avemaru (17 g) obsahuje 8,5 g Avemaru pulvis (prášok). Avemar pulvis je špeciálny, patentom chránený výtlačok, vyrábaný farmaceutickou technológiou, ktorého základnou, avšak iba východiskovou surovinou sú pšeničné klíčky.

3. Aké iné zložky pripravok obsahuje?

Dochucovadlá: fruktózu, prírodnú pomarančovú arómu, jedlú soľ. Pomocné látky: maltodextrín, koloidný oxid kremičitý (silica colloidalis anhydrica).

4. Kedy sa odporúča užívanie Avemaru?

Užívanie Avemaru sa odporúča ako doplnok klinickej onkologickej liečby (operácia, rádioterapia, chemoterapia, imunoterapia, atď.). Užívanie Avemaru sa odporúča pred, počas aj po ukončení onkologickej liečby, nepretržite, bez prerušenia. Avemar možno užívať v ktoromkoľvek štádiu nádorových ochorení. Po operácii možno začať s užívaním Avemaru, ak je pacient schopný prijímať potravu aspoň 4 dni bez ťažkostí.

5. Kedy možno začať s užívaním Avemaru?

S užívaním Avemaru je vhodné začať ihneď po diagnostikovaní nádorového ochorenia, nie je potrebné počkať na začatie onkologickej liečby.

6. Čo je potrebné vedieť pred začatím užívania?

Prípravok nemožno požívať ako jediný zdroj výživných látok! Užívanie Avemaru nenahrádza klasickú onkologickú

liečbu a lieky! Prípravok možno požívať len pod lekárskej dohľadom.

7. Ako sa Avemar užíva?

Užívanie prípravku sa odporúča nepretržite, bez prerušenia. Po ukončení onkologickej liečby sa odporúča ďalšie užívanie prípravku a to po dobu niekoľkých rokov až do úplného uzdravenia. Pokiaľ nepretržite užívanie Avemaru medzi časom z nejakých dôvodov prerušíte, neskôr môžete s jeho užívaním opäť začať.

8. Kedy sa pripravok nesmie užívať?

Prípravok nemožno užívať počas tehotenstva a dojčenia. U pacientov po transplantácii orgánu alebo tkaniva je užívanie Avemaru tak isto vylúčené. Prípravok nemožno užívať ani v prípade krvácajúcich erózií gastrointestinálneho traktu, respektíve v prípade ulcerai (krvácajúci žalúdočný vred alebo vred dvanástnika), enteritis/colitis (vážne zápal tráviaceho traktu), malabsorpčného syndrómu (závažné poruchy vstrebávania). Užívanie prípravku sa neodporúča ani v prípade intolerancie fruktózy, precitlivenosti na lepok (celiakia) alebo na ktorúkoľvek zložku prípravku.

9. Môžu Avemar užívať diabetici?

Áno, prípravok môžu užívať aj diabetici, pod lekárskej dozorom, s prihliadnutím na obsah uhľohydrátov.

10. V ktorých prípadoch je potrebné dočasne prerušiť užívanie Avemaru?

Počas vyšetrení, pri ktorých sa do tráviaceho systému dostávajú kontrastné látky (napríklad bárium – sulfátové röntgenové vyšetrenie žalúdka a čriev) sa odporúča prerušiť užívanie Avemaru už 2 dni pred vyšetrením, a v užívaní pokračovať v nasledujúci deň po vyšetrení. V každom prípade sú smerodajné pokyny ošetrojúceho lekára. Pokiaľ si vyšetrenia a zákroky vyžadujú, aby sa na ne pacient dostal s prázdny žalúdkom, je potrebné na to prihliadnuť pri užívaní Avemaru.

11. Môžu pripravok užívať deti?

Prípravok sa neodporúča u detí mladších ako 14 rokov.

12. Aké neželané účinky môže mať pripravok?

Vedľajšie účinky sa vyskytujú mimoriadne zriedka, v ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť redšia stolica, nevoľnosť alebo nutkanie na zvracanie.

13. Môže sa Avemar užívať spolu s inými liekmi, prípravkami?

Áno, môže. Medzi užitím vitamínu C a prípravkov s obsahom vitamínu C a užitím Avemaru je potrebné dodržať aspoň 2 hodinovú prestávku! Je vhodné užívať Avemar v inom čase, ako ostatné lieky alebo liečivé prípravky.

14. Ako sa Avemar pripravuje?

Pre prípravu jednej dávky nasypete obsah jedného vrecka (17 g) Avemaru do pohára. Do pohára nalejte ľubovoľne 1 - 2 dl vody (neperlivej minerálky), dôkladne zamiešajte a roztok vypite. Roztok, ktorý ste neužili do pol hodiny sa už neskôr nesmie použiť! Pre prípravu Avemaru sa môže použiť nealkoholický osviežujúci nápoj, čaj, kefir, jogurt, kakao alebo aj mlieko. Skúse-nosti potvrdzujú, že použitie chladnej, studenej tekutiny ovplyvní chuť roztoku, je príjemnejší. Je dôležité, aby tekutina použitá na prípravu nebola teplá alebo horúca! Neodporúča sa pripravovať Avemar s nápojom s obsahom vitamínu C (obsahujúcim kyselinu askorbovú alebo potravinovú prídavnú látku E 300). Avemar pripravený podľa návodu je možno pridať aj do vyzhivovacej sondy (vtedy je účelne rozpustiť ho v malom množstve vody).

15. Aká je denná odporúčaná dávka, a kedy sa odporúča užiť Avemar?

Pre dospelých s telesnou hmotnosťou do 90 kg sa odporúča užiť raz denne jednu dávku Avemaru, pripraveného podľa návodu opísaného vyššie, podľa možnosti asi 1 hodinu pred jedlom.

Pri telesnej hmotnosti nad 90 kg sa odporúča užívanie prípravku dva krát denne (ráno a večer), vždy po jednej dávke (2 x 17 g vrecko)

16. Ako sa Avemar uskladňuje a dopravné?

Uskladňuje sa na suchom a chladnom mieste, chránený pred teplotou. Odporúčame ho skladovať pod teplotou 15 °C, podľa možnosti v chladničke. Uskladňujte ho mimo dosahu detí! Dbajte o to, aby prípravok počas prepravy nebol dlhší čas vystavený značnému tepelnému vplyvu.

17. Aké vedecké výskumy boli uskutočnené s Avemarom?

Pozrite si prosím domovskú stránku www.avemar.com. Tam získate prehľad o významných domácich a zahraničných publikáciách, ktoré podávajú správu o výsledkoch klinických výskumov, vykonaných s prípravkom Avemar.



Jednotka balenia:

30 vreciek/balenia, netto hmotnosť 510 g (30 x 17 g). Identifikačné číslo OÉTI (Hungary): 1100/2009 Schválené Úradom Verejného Zdravotníctva SR

Výrobca: Biopharma Kft. 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6. Hungary

Výhradný distribútor: GALLEE s.r.o. Černyševského 5, 851 01 Bratislava silviagallee@stonline.sk +421 910 999 905 www.avemar.sk

Informácie pre užívateľov Avemar granulát a Avemar filmom obalené tablety

Pre pacientov
s nádorovými ochoreniami

avemar filmom obalené tablety

Výživový doplnok



Informácie pre užívateľov

1. Čo sú Avemar filmom obalené tablety?

Avemar filmom obalené tablety slúžia ako špeciálny výživový doplnok pre pacientov s nádorovými ochoreniami.

2. Aké sú aktívne zložky Avemaru?

Avemar pulvis je špeciálny, patentom chránený výťažok, vyrábaný farmaceutickou technológiou, ktorého základnou, avšak iba východiskovou surovinou sú pšeničné klíčky.

10 ks Avemar filmom obalených tabliet obsahuje 7,4 g Avemar pulvis koncentrátu. 10 ks Avemar filmom obalených tabliet sa rovná 1 vrecku (17 g) tradičného mikrogranulátu Avemar.

3. Obsahuje Avemar filmom obalená tableta pridaný cukor, sladidlo a arómu?

Neobsahuje.

4. Kedy sa odporúča užívanie Avemaru?

Užívanie Avemaru sa odporúča ako doplnok klinickej onkologickej liečby (operácia, rádioterapia, chemoterapia, imunoterapia, atď.). Užívanie Avemaru sa odporúča pred, počas aj po ukončení onkologickej liečby, nepretržite, bez prerušenia. Avemar možno užívať v ktoromkoľvek štádiu nádorových ochorení. Po operácii možno začať s užívaním Avemaru, ak je pacient schopný prijímať potravu aspoň 4 dni bez ťažkostí.

5. Kedy možno začať s užívaním Avemaru?

S užívaním Avemaru je vhodné začať už po diagnostikovaní nádorového ochorenia, nie je potrebné počkať na začatie onkologickej liečby.

6. Čo je potrebné vedieť pred začatím užívania?

Prípravok nemožno požívať ako jediný zdroj výživných látok! Prípravok sa

nesmie užívať ako náhrada rozmanitej stravy. Užívanie Avemaru nenahrádza klasickú onkologickú liečbu a lieky! Prípravok možno požívať len pod lekárom dohľadom.

7. Ako sa Avemar užíva?

Užívanie prípravku sa odporúča nepretržite, bez prerušenia. Po ukončení onkologickej liečby sa odporúča ďalšie užívanie prípravku a to po dobu niekoľkých rokov až do úplného uzdravenia. Pokiaľ nepretržite užívanie Avemaru medzi časom z nejakých dôvodov prerušíte, neskôr môžete s jeho užívaním opäť začať.

8. Kedy sa prípravok nesmie užívať?

Prípravok nemožno užívať počas tehotenstva a dojčenia. U pacientov po transplantácii orgánu alebo tkaniva je užívanie Avemaru tak isto vylúčené. Prípravok nemožno užívať taktiež v prípade krváčajúcich erózií gastrointestinálneho traktu, respektíve v prípade ulcusai (krvácajúci žalúdočný vred alebo vred dvanástnika), enteritis/colitis (vážne zápaly tráviaceho traktu), malabsorpčného syndrómu (závažné poruchy vstrebávania). Užívanie prípravku sa neodporúča tiež v prípade intolerancie fruktózy, precitlivenosť na lepok (celiakia), alebo v prípade na ktorúkoľvek zložku prípravku.

9. v ktorých prípadoch je potrebné dočasne prerušiť užívanie Avemaru?

Počas vyšetrení, pri ktorých sa do tráviaceho systému dostávajú kontrastné látky (napríklad bárium – sulfátové röntgenové vyšetrenie žalúdka a čriev) sa odporúča prerušiť užívanie Avemaru už 2 dni pred vyšetrením, a v užívaní pokračovať v nasledujúci deň po vyšetrení. v každom prípade sú smerodajné pokyny ošetrojúceho lekára. Pokiaľ si vyšetrenia a zákroky vyžadujú, aby sa na ne pacient dostavil s prázdny žalúdkom, je potrebné na to prihliadnuť pri užívaní Avemaru.

10. Môžu prípravok užívať deti?

Prípravok sa neodporúča u detí mladších ako 14 rokov.

11. Aké neželané účinky môže mať prípravok?

Vedľajšie účinky sa vyskytujú mimoriadne zriedka, v ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť redšia stolica, nevoľnosť alebo nutkanie na zvracanie.

12. Môže sa Avemar užívať spolu s inými liekmi, prípravkami?

Áno, môže. Medzi užitím vitamínu C a prípravok s obsahom vitamínu C a užitím Avemaru je potrebné dodržať aspoň 2 hodinovú prestávku! Je vhodné užívať Avemar v inom čase, ako ostatné lieky alebo liečivé prípravky.

13. Aká je denná odporúčaná dávka, a kedy sa odporúča užívať Avemar?

Odporúča sa užívať pri telesnej hmotnosti do 50 kg 2 x 4 tabletky deň, pri telesnej hmotnosti medzi 50 - 90 kg 2 x 5 tabletiék/deň, pri telesnej hmotnosti nad 90 kg 2 x 7 tabletiék/deň, je účelné užiť polovicu dennej dávky ráno a polovicu večer.

14. Ako sa Avemar filmom obalené tablety uskladňujú a dopravujú?

Uskladňujú sa chránené pred teplom, pri izbovej teplote (max. 22 °C), v prípade teploty nad 22 °C ich treba skladovať v chladničke. Uskladňujte ho uzamknutý mimo dosahu detí! Dbajte o to, aby prípravok počas prepravy nebol dlhší čas vystavený značnému tepelnému vplyvu!

15. Je výrobca dobre známeho mikrogranulátu vo vreckách Avemar totožný s výrobcom Avemar filmom obalených tabliet?

Áno, je totožný. Oba výrobky vyrába

Biopharma s.r.o. Príprava účinnej látky Avemar pulvis (prášok)sa v oboch prípadoch uskutočňuje pomocou rovnakého postupu, za použitia rovnakých zložiek.

16. Aké vedecké výskumy boli uskutočnené s Avemarom?

Pozrite si prosím domovskú stránku www.avemar.com, kde získate prehľad o významných domácich a zahraničných publikáciách, ktoré podávajú správu o výsledkoch klinických výskumov, vykonaných s prípravkom Avemar.



Jednotka balenia:

Netto hmotnosť 312 g (2 x 150 ks tabliet obalených filmom po 1040 mg)
Číslo notifikácie OÉTI (Maďarsko): 1125/2010
Schválené Úradom verejného zdravotníctva SR

Výrobca: Biopharma Kft.
6413 Kunfehértó, IV. körzet 6.
Hungary

Výhradný distribútor: GALLEE s.r.o.
Černyševského 5, 851 01 Bratislava
silviagallee@stonline.sk
+421 910 999 905
www.avemar.sk